

Ulotka informacyjna dotycząca wysoce zjadliwej grypy ptaków.

1. Podmioty utrzymujące ptaki:

- obserwują stan zdrowia i zachowanie zwierząt, za które odpowiadają;
- obserwują zmiany w normalnych parametrach produkcji w zakładach, u zwierząt lub w materiale biologicznym, za które odpowiadają, jeżeli rodzą one podejrzenia, że zmiany te zostały spowodowane chorobą umieszczoną w wykazie lub nowo występującą chorobą;
- zwracają uwagę na nietypowe upadki zwierząt i na inne objawy poważnej choroby u zwierząt, za które odpowiadają.

2. Podmioty oraz inne odpowiednie osoby fizyczne lub prawne:

- niezwłocznie powiadamiają właściwy organ, jeżeli istnieją jakiegokolwiek powody, by podejrzewać występowanie u zwierząt choroby kategorii A;
- powiadamiają o nietypowych upadkach zwierząt i o innych objawach poważnej choroby lub o spadku wskaźników produkcji o nieustalonej przyczynie, w celu dalszego dochodzenia, łącznie z pobraniem próbek do badań laboratoryjnych, jeżeli sytuacja tego wymaga.

3. Na podejrzenie wystąpienia grypy ptaków mogą wskazywać następujące objawy kliniczne:

- 1) wczesne objawy mogą obejmować zmniejszenie apetytu i pragnienia oraz stosunkowo niską śmiertelność,
- 2) chore ptaki często siedzą lub stoją w półotępiącym stanie, dotykając głowami podłoga,
- 3) obrzęk i sinica grzebieni i dzwonek, a na ich końcach mogą pojawiać się wylewy krwawe lub wybroczyny,
- 4) trudności z oddychaniem,
- 5) obfite łzawienie,
- 6) wodnista biegunka i nadmierne pragnienie,
- 7) na nieopierzonych miejscach skóry można obserwować wylewy krwawe,
- 8) upadkowość w stadzie może osiągnąć 100 %.
- 9) choroba może jednak pojawiać się w stadach nagle, powodując śmierć wielu ptaków bez uprzednich objawów lub przy wystąpieniu minimalnych objawów depresji, zmniejszonego apetytu, stroszenia piór i gorączki,
- 10) kury nioski mogą początkowo składać jaja o miękkich skorupkach lub pozbawione skorup (tzw. lanie jaj), następuje spadek nieśności,
- 11) u brojlerów i indyków objawy HPAI są często mniej wyraźne niż u innych rodzajów drobiu, pierwszą wyraźną zaobserwowaną anomalią może być bardzo wyraźny wzrost upadkowości, mogą również występować obrzęk głowy i szyi oraz objawy neurologiczne, jak kręcz szyi i ataksja,
- 12) u gęsi i kaczek okres bezobjawowy może być nawet kilkunastodniowy, częściej niż u innych gatunków mogą występować objawy neurologiczne i niższa śmiertelność.

4. W przypadku podejrzenia wystąpienia grypy ptaków, posiadacz zwierzęcia jest obowiązany do:

- 1) pozostawienia zwierząt w miejscu ich przebywania i niewprowadzania tam innych zwierząt;
- 2) uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o chorobę lub zwłoki zwierzęce;
- 3) wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych w rozumieniu przepisów o nawozach i nawożeniu i innych przedmiotów znajdujących się w miejscu, w którym wystąpiła choroba;

- 4) udostępnienia organom Inspekcji Weterynaryjnej zwierząt i zwłok zwierzęcych do badań i zabiegów weterynaryjnych, a także udzielania pomocy przy ich wykonywaniu;
- 5) udzielania organom Inspekcji Weterynaryjnej oraz osobom działającym w imieniu tych organów wyjaśnień i podawania informacji, które mogą mieć znaczenie dla wykrycia choroby i źródeł zakażenia lub zapobiegania jej szerzeniu.